

Sýklalyfjanæmi 2013

Tölur ná yfir tímabilið frá 1.janúar til 31. desember.

Endurteknar ræktanir frá sama einstaklingi eru útilokaðar.

Næmispófsstaðlar frá EUCAST voru teknir í notkun í mars 2012

Staphylococcus aureus


Allir stofnar	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Penicillin G	87%	0%	13%	86%	0%	14%	1%	0%	-1%	1976	1961
Cefoxitine*	3%	0%	97%	4%	0%	96%	-1%	0%	1%	1976	1965
Erythromycin	9%	<1%	91%	10%	<1%	90%	-1%	<1%	1%	1753	1770
Clindamycin	8%	1%	91%	7%	<1%	93%	1%	<1%	-2%	1752	1770

Landspítali legudeildir	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Penicillin G	88%	0%	12%	85%	0%	15%	3%	0%	-3%	928	910
Cefoxitine*	2%	0%	98%	3%	0%	97%	-1%	0%	1%	928	913
Erythromycin	10%	<1%	90%	11%	<1%	89%	-1%	<1%	1%	836	826
Clindamycin	9%	<1%	91%	9%	<1%	91%	0%	<1%	0%	836	826

Aðrir	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Penicillin G	86%	0%	14%	86%	0%	14%	0%	0%	0%	1048	1051
Cefoxitine*	4%	0%	96%	4%	0%	96%	0%	0%	0%	1048	1052
Erythromycin	9%	<1%	91%	10%	<1%	90%	-1%	<1%	1%	917	944
Clindamycin	7%	1%	92%	7%	<1%	93%	0%	<1%	-1%	916	944

*Lyf notað til að prófa næmi fyrir staphylókokka penisillínum.

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) Staphylococcus aureus



Staphylococcus kóagúlása neikvæður

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Penicillin G	82%	0%	18%	80%	0%	20%	2%	0%	-2%	1132	1047
Cefoxitine*	28%	0%	72%	30%	0%	70%	-2%	0%	2%	1132	1046
Erythromycin	42%	<1%	58%	45%	<1%	55%	-3%	<1%	3%	552	504
Clindamycin	27%	1%	72%	31%	1%	68%	-4%	0%	4%	552	505

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali legudeildir											
Penicillin G	84%	0%	16%	81%	0%	19%	3%	0%	-3%	524	496
Cefoxitine*	35%	0%	65%	39%	0%	61%	-4%	0%	4%	524	495
Erythromycin	47%	<1%	53%	47%	1%	52%	0%	<1%	1%	272	270
Clindamycin	33%	1%	66%	38%	1%	61%	-5%	0%	5%	272	270

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Aðrir											
Penicillin G	80%	0%	20%	80%	0%	20%	0%	0%	0%	608	551
Cefoxitine*	22%	0%	78%	23%	0%	77%	-1%	0%	1%	608	551
Erythromycin	36%	0%	64%	42%	0%	57%	-6%	0%	7%	280	234
Clindamycin	20%	2%	78%	24%	<1%	76%	-4%	2%	2%	280	235

*Lyf notað til að prófa næmi fyrir staphylókokka penisillínum.


Streptococcus pneumoniae

Allir stofnar	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Penicillin G	1%	24%	75%	7%	27%	66%	-6%	-3%	9%	482	728
Ceftriaxone	1%	3%	97%	0%	2%	98%	1%	1%	-1%	482	724
Tetracycline	25%	1%	74%	33%	<1%	67%	-8%	<1%	7%	484	727
Erythromycin	27%	0%	73%	35%	<1%	65%	-8%	<1%	8%	484	727
Chloramphenicol	1%	0%	99%	1%	0%	99%	0%	0%	0%	484	724
Trimethoprim/sulfamethoxazole	33%	3%	64%	41%	1%	58%	-8%	2%	6%	484	725

Landspítali legudeildir	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Penicillin G	0%	30%	70%	9%	27%	64%	-9%	3%	6%	100	130
Ceftriaxone	0%	1%	99%	0%	3%	97%	0%	-2%	2%	100	130
Tetracycline	29%	1%	70%	37%	0%	63%	-8%	1%	7%	101	129
Erythromycin	31%	0%	69%	39%	1%	60%	-8%	-1%	9%	101	129
Chloramphenicol	1%	0%	99%	2%	0%	98%	-1%	0%	1%	101	127
Trimethoprim/sulfamethoxazole	34%	4%	62%	42%	1%	57%	-8%	3%	5%	101	128

Aðrir	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Penicillin G	1%	23%	76%	6%	27%	67%	-5%	-4%	9%	380	598
Ceftriaxone	0%	3%	97%	0%	2%	98%	0%	1%	-1%	380	597
Tetracycline	25%	1%	74%	32%	<1%	68%	-7%	<1%	6%	381	598
Erythromycin	26%	0%	74%	34%	<1%	66%	-8%	<1%	8%	381	598
Chloramphenicol	1%	0%	99%	1%	0%	99%	0%	0%	0%	381	597
Trimethoprim/sulfamethoxazole	33%	2%	65%	39%	2%	58%	-6%	0%	7%	381	597

Hlutfall ónæmra stofna(I og R) Streptococcus pneumoniae




Streptococcus pyogenes

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Penicillin G	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	390	474
Tetracycline	8%	<1%	92%	12%	0%	88%	-4%	<1%	4%	372	452
Erythromycin	3%	<1%	97%	4%	1%	95%	-1%	<1%	2%	372	452
Clindamycin	3%	<1%	97%	5%	0%	95%	-2%	<1%	2%	371	452

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali legudeildir											
Penicillin G	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	71	95
Tetracycline	12%	1%	87%	13%	0%	87%	-1%	1%	0%	70	91
Erythromycin	6%	0%	94%	4%	0%	96%	2%	0%	-2%	70	91
Clindamycin	4%	0%	96%	4%	0%	96%	0%	0%	0%	70	91

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Aðrir											
Penicillin G	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	318	379
Tetracycline	8%	0%	92%	12%	0%	88%	-4%	0%	4%	301	361
Erythromycin	2%	1%	97%	6%	0%	94%	-4%	0%	3%	301	361
Clindamycin	3%	<1%	97%	3%	1%	96%	0%	<1%	1%	301	361

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) Streptococcus pyogenes



Enterókokkar

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Ampicillin	11%	<1%	89%	10%	0%	90%	1%	<1%	-1%	1218	1115
Gentamicin*	16%	0%	84%	15%	<1%	85%	1%	<1%	-1%	1218	1108
Nitrofurantoin	3%	<1%	97%	5%	<1%	94%	-2%	<1%	3%	1052	951
Vancomycin	<1%	0%	100%	1%	0%	99%	<1%	0%	1%	1218	1115


	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali legudeildir											
Ampicillin	16%	<1%	84%	15%	0%	85%	1%	<1%	-1%	678	596
Gentamicin*	18%	0%	82%	16%	0%	84%	2%	0%	-2%	678	593
Nitrofurantoin	3%	1%	96%	9%	<1	91%	-6%	<1%	5%	547	464
Vancomycin	<1%	0%	100%	1%	0%	99%	<1%	0%	1%	678	596

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali bráðamóttökur, Læknastofur, Heilsugæslur og aðrar sjúkrastofnanir											
Ampicillin	6%	0%	94%	4%	0%	96%	2%	0%	-2%	461	432
Gentamicin*	13%	0%	87%	13%	0%	83%	0%	0%	4%	461	429
Nitrofurantoin	3%	<1%	97%	2%	<1%	97%	1%	<1%	0%	428	401
Vancomycin	0%	0%	100%	2%	0%	98%	-2%	0%	2%	461	432

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Öldrunarstofnanir											
Ampicillin	3%	0%	97%	7%	0%	93%	-4%	0%	4%	79	87
Gentamicin*	16%	0%	84%	17%	0%	83%	-1%	0%	1%	79	86
Nitrofurantoin	0%	0%	100%	2%	0%	98%	-2%	0%	2%	77	86
Vancomycin	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	79	87

*Gentamicin er ekki ætlað til meðhöndlunar á enterókokkum eitt og sér. Næmi fyrir gentamicin gefur því aðeins til kynna synergy með penisillín lyfjum.

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) Enterókokkar



E. coli

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Ampicillin***	43%	0%	57%	44%	3%	53%	-1%	-3%	4%	5677	5606
Mecillinam	7%	0%	93%	6%	1%	93%	1%	-1%	0%	5354	5292
Amoxicillin/clavulanic acid***	12%	0%	88%	17%	4%	79%	-5%	-4%	9%	2961	3000
Piperacillin/tazobactam	1%	2%	97%	3%	4%	93%	-2%	-2%	4%	2952	2946
Cefpodoxime*	4%	<1%	96%	4%	0%	96%	0%	<1%	0%	5583	5607
Cefuroxime**	6%	0%	94%	7%	1%	92%	-1%	-1%	2%	2829	2879
Ceftriaxone	5%	<1%	95%	5%	0%	95%	0%	<1%	0%	2959	3000
Gentamicin	6%	0%	94%	6%	0%	94%	0%	0%	0%	2961	2991
Trimethoprim	23%	<1%	74%	22%	0%	78%	1%	<1%	-4%	5360	5300
Trimethoprim/sulfamethoxazole	22%	<1%	78%	21%	1%	78%	1%	<1%	0%	5677	5607
Nitrofurantoin	2%	1%	97%	2%	1%	97%	0%	0%	0%	5363	5300
Ciprofloxacin	12%	<1%	88%	12%	<1%	88%	0%	<1%	0%	2964	3015

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali legudeildir											
Ampicillin***	44%	0%	56%	46%	2%	52%	-2%	-2%	4%	1643	1606
Mecillinam	7%	0%	93%	6%	<1%	93%	1%	<1%	0%	1435	1404
Amoxicillin/clavulanic acid***	10%	0%	90%	16%	3%	81%	-6%	-3%	9%	1636	1592
Piperacillin/tazobactam	1%	2%	97%	3%	3%	94%	-2%	-1%	3%	1635	1571
Cefpodoxime*	6%	1%	93%	5%	1%	94%	1%	0%	-1%	1608	1606
Cefuroxime**	6%	0%	94%	6%	1%	93%	0%	-1%	1%	1623	1592
Ceftriaxone	5%	<1%	95%	3%	<1%	97%	2%	<1%	-2%	1637	1595
Gentamicin	5%	<1%	95%	4%	<1%	96%	1%	<1%	-1%	1638	1593
Trimethoprim	25%	0%	75%	24%	0%	76%	1%	0%	-1%	1442	1406
Trimethoprim/sulfamethoxazole	22%	0%	78%	22%	<1%	78%	0%	<1%	0%	1643	1606
Nitrofurantoin	2%	1%	97%	2%	1%	97%	0%	0%	0%	1443	1405
Ciprofloxacin	11%	<1%	89%	12%	<1%	88%	-1%	<1%	1%	1636	1597

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali bráðamóttökur, Læknastofur, Heilsugæslur og aðrar sjúkrostofnanir											
Ampicillin***	42%	0%	58%	42%	3%	56%	0%	-3%	2%	3662	3536
Mecillinam	6%	<1%	94%	6%	1%	93%	0%	<1%	1%	3553	3426
Cefpodoxime*	3%	<1%	97%	3%	1%	96%	0%	<1%	1%	3606	3537
Trimethoprim	22%	0%	78%	21%	<1%	79%	1%	<1%	-1%	3552	3431
Trimethoprim/sulfamethoxazole	22%	<1%	78%	20%	1%	79%	2%	<1%	-1%	3662	3537
Nitrofurantoin	2%	<1%	98%	2%	1%	97%	0%	<1%	1%	3554	3432
Ciprofloxacin	11%	<1%	89%	12%	<1%	88%	-1%	<1%	1%	1283	1346


	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Öldrunarstofnanir											
Ampicillin	56%	0%	44%	56%	4%	41%	0%	-4%	3%	372	464
Mecillinam	12%	0%	88%	11%	1%	89%	1%	-1%	-1%	366	462
Cefpodoxime*	4%	0%	96%	5%	0%	95%	-1%	0%	1%	369	464
Trimethoprim	25%	<1%	75%	26%	1%	73%	-1%	<1%	2%	366	463
Trimethoprim/sulfamethoxazole	22%	1%	77%	24%	1%	75%	-2%	0%	2%	372	464
Nitrofurantoin	8%	1%	91%	6%	1%	93%	2%	0%	-2%	366	463
Ciprofloxacin	25%	0%	75%	38%	1%	61%	-13%	-1%	14%	48	72

*Lyf notað til skimunar fyrir breiðvirkum beta-laktamösum (ESBL)

**Næmi fyrir cefuroxime miðast við stungulýf

*** Samkvæmt EUCAST staðli er ekki gert ráð fyrir minnkuðu næmi (I) hjá ampicillin og amoxicillin/clavulanic acid

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) E.coli



E. coli aldurstengd gögn

Aldur 0-19 ára	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	46%	0%	54%	42%	2%	56%	4%	-2%	-2%	764	706
Mecillinam	8%	<1%	92%	5%	<1%	95%	3%	<1%	-3%	731	676
Cefpodoxime*	3%	<1%	97%	4%	<1%	96%	-1%	<1%	1%	751	706
Trimethoprim	22%	<1%	78%	21%	0%	79%	1%	<1%	-1%	731	677
Trimethoprim/sulfamethoxazole	20%	0%	80%	19%	1%	80%	1%	-1%	0%	764	706
Nitrofurantoin	1%	<1%	99%	0%	1%	99%	1%	<1%	0%	730	677
Ciprofloxacin	1%	<1%	99%	3%	<1%	96%	-2%	<1%	3%	385	338

Aldur 20-59 ára	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	41%	0%	59%	39%	3%	58%	2%	-3%	1%	1827	1854
Mecillinam	4%	0%	96%	6%	<1%	94%	-2%	<1%	2%	1691	1719
Cefpodoxime*	5%	<1%	95%	4%	0%	96%	1%	<1%	-1%	1800	1855
Trimethoprim	23%	0%	77%	20%	0%	80%	3%	0%	-3%	1689	1719
Trimethoprim/sulfamethoxazole	22%	<1%	78%	19%	<1%	81%	3%	<1%	-3%	1827	1855
Nitrofurantoin	1%	<1%	99%	1%	1%	98%	0%	<1%	1%	1692	1720
Ciprofloxacin	12%	0%	88%	11%	0%	89%	1%	0%	-1%	845	906

Aldur 60 ára og eldri	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	44%	0%	56%	48%	2%	50%	-4%	-2%	6%	3081	3035
Mecillinam	7%	<1%	93%	7%	1%	92%	0%	<1%	1%	2928	2886
Cefpodoxime*	4%	<1%	96%	4%	1%	95%	0%	<1%	1%	3027	3035
Trimethoprim	24%	<1%	76%	24%	0%	76%	0%	<1%	0%	2937	2893
Trimethoprim/sulfamethoxazole	22%	<1%	78%	22%	<1%	78%	0%	<1%	0%	3081	3035
Nitrofurantoin	3%	1%	96%	3%	1%	96%	0%	0%	0%	2937	2892
Ciprofloxacin	13%	<1%	86%	15%	<1%	85%	-2%	<1%	1%	1751	1760

*Lyf notað til skimunar fyrir breiðvirkum beta-laktamósum (ESBL)

Enterobacteriaceae aðrar en E.coli

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Ampicillin	78%	0%	22%	77%	<1%	23%	1%	<1%	-1%	2004	1842
Mecillinam	6%	<1%	94%	9%	1%	90%	-3%	<1%	4%	1070	263
Amoxicillin/clavulanic acid	36%	0%	64%	37%	1%	62%	-1%	-1%	2%	1358	1286
Cefpodoxime*	9%	2%	89%	9%	3%	88%	0%	-1%	1%	1915	1796
Cefuroxime**	10%	0%	90%	13%	1%	86%	-3%	-1%	4%	799	847
Ceftriaxone	7%	2%	91%	8%	1%	91%	-1%	1%	0%	1402	1330
Gentamicin	2%	0%	98%	2%	<1%	98%	0%	<1%	0%	1352	1286
Trimethoprim	20%	3%	77%	23%	4%	73%	-3%	-1%	4%	1586	1406
Trimethoprim/sulfamethoxazole	12%	1%	87%	13%	2%	85%	-1%	-1%	2%	2006	1842
Nitrofurantoin	44%	8%	48%	46%	9%	45%	-2%	-1%	3%	1586	1408
Ciprofloxacin	3%	1%	96%	4%	1%	95%	-1%	0%	1%	1406	1344

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali legudeildir											
Ampicillin	88%	0%	12%	87%	1%	12%	1%	-1%	0%	871	820
Mecillinam	4%	0%	96%	9%	1%	90%	-5%	-1%	6%	376	104
Amoxicillin/clavulanic acid	37%	0%	63%	40%	1%	59%	-3%	-1%	4%	866	815
Cefpodoxime*	13%	3%	84%	15%	4%	81%	-2%	-1%	3%	840	814
Cefuroxime**	10%	0%	90%	15%	1%	84%	-5%	-1%	6%	524	566
Ceftriaxone	7%	2%	91%	10%	1%	89%	-3%	1%	2%	870	819
Gentamicin	2%	0%	98%	2%	<1%	98%	0%	<1%	0%	866	815
Trimethoprim	18%	3%	79%	23%	5%	72%	-5%	-2%	7%	588	522
Trimethoprim/sulfamethoxazole	10%	1%	89%	14%	1%	85%	-4%	0%	4%	873	820
Nitrofurantoin	35%	8%	54%	41%	11%	48%	-6%	-3%	6%	588	522
Ciprofloxacin	2%	<1%	98%	4%	1%	95%	-2%	<1%	3%	868	820


	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali bráðamóttökur, Læknastofur, Heilsugæslur og aðrar sjúkrostofnanir											
Ampicillin	76%	0%	24%	75%	<1%	25%	1%	<1%	-1%	853	755
Mecillinam	5%	<1%	95%	5%	2%	94%	0%	-1%	1%	475	107
Amoxicillin/clavulanic acid	34%	0%	66%	31%	1%	68%	3%	-1%	-2%	431	405
Cefpodoxime*	6%	2%	92%	5%	3%	92%	1%	-1%	0%	798	715
Cefuroxime**	10%	0%	90%	9%	1%	90%	1%	-1%	0%	254	255
Ceftriaxone	7%	1%	92%	4%	1%	95%	3%	0%	-3%	475	446
Gentamicin	3%	0%	97%	1%	1%	98%	2%	-1%	-1%	428	405
Trimethoprim	18%	3%	79%	19%	3%	78%	-1%	0%	1%	723	620
Trimethoprim/sulfamethoxazole	11%	1%	88%	11%	2%	87%	0%	-1%	1%	853	755
Nitrofurantoin	42%	9%	49%	40%	9%	51%	2%	0%	-2%	723	622
Ciprofloxacin	4%	1%	95%	3%	2%	95%	1%	-1%	0%	476	451

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Öldrunarstofnanir											
Ampicillin	54%	0%	46%	52%	1%	47%	2%	-1%	-1%	280	267
Mecillinam	9%	0%	91%	17%	2%	81%	-8%	-2%	10%	218	52
Cefpodoxime*	5%	3%	93%	4%	1%	95%	1%	2%	-2%	277	267
Trimethoprim	28%	3%	69%	30%	6%	64%	-2%	-3%	5%	275	264
Trimethoprim/sulfamethoxazole	21%	1%	78%	17%	3%	80%	4%	-2%	-2%	280	267
Nitrofurantoin	66%	4%	30%	70%	5%	25%	-4%	-1%	5%	275	264
Ciprofloxacin	16%	5%	79%	11%	3%	86%	5%	2%	-7%	62	73

*Lyf notað til skimunar fyrir breiðvirkum beta-laktamósum (ESBL)

** Næmi cefuroxime miðast við stungulýf

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) Enterobacteriaceae aðrar en E.coli



Enterobacteriaceae aðrar en E.coli aldurstengd gögn

Aldur 0-19 ára	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	69%	0%	31%	72%	1%	27%	-3%	-1%	4%	132	124
Mecillinam	6%	0%	94%	7%	0%	93%	-1%	0%	1%	65	68
Amoxicillin/clavulanic acid	42%	0%	58%	44%	1%	55%	-2%	-1%	3%	90	98
Cefpodoxime*	16%	1%	83%	17%	4%	79%	-1%	-3%	4%	119	119
Cefuroxime**	16%	0%	84%	20%	0%	80%	-4%	0%	4%	51	64
Ceftriaxone	13%	2%	85%	11%	1%	88%	2%	1%	-3%	100	103
Gentamicin	2%	0%	98%	1%	1%	98%	1%	-1%	0%	89	98
Trimethoprim	19%	4%	77%	30%	1%	68%	-11%	3%	9%	96	82
Trimethoprim/sulfamethoxazole	15%	1%	84%	13%	3%	84%	2%	-2%	0%	132	124
Nitrofurantoin	51%	7%	42%	45%	7%	48%	6%	0%	-6%	96	82
Ciprofloxacin	2%	0%	98%	6%	3%	91%	-4%	-3%	7%	99	103

Aldur 20-59 ára	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	82%	0%	18%	79%	0%	21%	3%	0%	-3%	429	387
Mecillinam	5%	0%	95%	5%	1%	94%	0%	-1%	1%	185	180
Amoxicillin/clavulanic acid	42%	0%	58%	41%	1%	58%	1%	-1%	0%	271	265
Cefpodoxime*	6%	3%	91%	8%	3%	89%	-2%	0%	2%	388	360
Cefuroxime**	5%	0%	95%	15%	1%	84%	-10%	-1%	11%	145	186
Ceftriaxone	5%	1%	94%	8%	0%	92%	-3%	1%	2%	303	292
Gentamicin	1%	0%	99%	2%	0%	98%	-1%	0%	1%	272	266
Trimethoprim	17%	1%	82%	17%	3%	80%	0%	-2%	2%	290	246
Trimethoprim/sulfamethoxazole	8%	1%	91%	11%	1%	89%	-3%	0%	2%	429	387
Nitrofurantoin	35%	10%	55%	37%	10%	53%	-2%	0%	2%	290	247
Ciprofloxacin	2%	1%	97%	5%	0%	95%	-3%	1%	2%	303	293

Aldur 60 ára og eldri	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	77%	0%	23%	77%	0%	23%	0%	0%	0%	1443	1330
Mecillinam	6%	<1%	94%	7%	0%	93%	-1%	<1%	1%	820	792
Amoxicillin/clavulanic acid	34%	0%	66%	35%	1%	64%	-1%	-1%	2%	997	922
Cefpodoxime*	9%	2%	89%	9%	3%	88%	0%	-1%	1%	1408	1316
Cefuroxime**	11%	0%	89%	12%	2%	86%	-1%	-2%	3%	603	596
Ceftriaxone	7%	2%	91%	9%	1%	91%	-2%	1%	0%	1000	934
Gentamicin	3%	0%	97%	2%	0%	98%	1%	0%	-1%	991	921
Trimethoprim	21%	3%	76%	23%	5%	72%	-2%	-2%	4%	1200	1077
Trimethoprim/sulfamethoxazole	13%	1%	86%	14%	2%	84%	-1%	-1%	2%	1445	1330
Nitrofurantoin	45%	8%	47%	48%	9%	43%	-3%	-1%	4%	1200	1078
Ciprofloxacin	4%	1%	95%	4%	1%	95%	0%	0%	0%	1004	947

*Lyf notað til skimunar fyrir breiðvirkum beta-laktamósum (ESBL)

**Næmi fyrir cefuroxime miðast við stungulyf

Pseudomonas aeruginosa


	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Piperacillin	7%	0%	93%	9%	0%	91%	-2%	0%	2%	560	606
Ceftazidime	4%	0%	96%	5%	<1	95%	-1%	<1%	1%	560	606
Meropenem	5%	5%	90%	6%	5%	89%	-1%	0%	1%	561	606
Gentamicin	3%	0%	97%	2%	<1	98%	1%	<1%	-1%	560	605
Tobramycin	0%	0%	100%	1%	0%	99%	-1%	0%	1%	560	606
Ciprofloxacin	7%	2%	91%	13%	2%	85%	-6%	0%	6%	560	606

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali legudeildir											
Piperacillin	9%	0%	91%	8%	0%	92%	1%	0%	-1%	306	315
Ceftazidime	6%	0%	94%	4%	0%	96%	2%	0%	-2%	306	315
Meropenem	7%	5%	88%	6%	4%	90%	1%	1%	-2%	307	315
Gentamicin	4%	0%	96%	3%	0%	97%	1%	0%	-1%	306	315
Tobramycin	0%	0%	100%	1%	0%	99%	-1%	0%	1%	306	315
Ciprofloxacin	10%	1%	89%	14%	1%	85%	-4%	0%	4%	306	315

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Landspítali bráðamóttökur, Læknastofur, Heilsugæslur og aðrar sjúkrastofnanir											
Piperacillin	4%	0%	96%	9%	0%	91%	-5%	0%	5%	210	229
Ceftazidime	2%	0%	98%	5%	<1%	95%	-3%	<1%	3%	210	229
Meropenem	4%	4%	92%	6%	6%	88%	-2%	-2%	4%	210	229
Gentamicin	2%	0%	98%	1%	1%	98%	1%	-1%	0%	210	228
Tobramycin	0%	0%	100%	<1%	0%	>99%	<1%	0%	<1%	210	229
Ciprofloxacin	5%	2%	93%	9%	2%	89%	-4%	0%	4%	210	229

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Öldrunarstofnanir											
Piperacillin	9%	0%	91%	11%	0%	89%	-2%	0%	2%	44	62
Ceftazidime	4%	0%	96%	5%	0%	95%	-1%	0%	1%	44	62
Meropenem	5%	4%	91%	5%	10%	85%	0%	-6%	6%	44	62
Gentamicin	2%	0%	98%	2%	0%	98%	0%	0%	0%	44	62
Tobramycin	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	44	62
Ciprofloxacin	5%	0%	95%	21%	3%	76%	-16%	-3%	19%	44	62

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) P. aeruginosa



Haemophilus influenzae

	2013			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S		
Allir stofnar					
Cefuroxime*	28%	<1%	72%	704	1035
Tetracycline	1%	0%	99%	706	1034
Trimethoprim/sulfamethoxazole	23%	1%	76%	706	1034

	2013			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S		
Landspítali legudeildir					
Cefuroxime*	31%	1%	68%	166	184
Tetracycline	2%	0%	98%	165	183
Trimethoprim/sulfamethoxazole	28%	1%	71%	165	183

	2013			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S		
Aðrir					
Cefuroxime*	27%	<1%	73%	538	851
Tetracycline	0%	0%	100%	541	851
Trimethoprim/sulfamethoxazole	21%	2%	77%	541	851

** Næmi fyrir cefuroxime miðast við stungulyf. Ný viðmið í EUCAST staðli skýra aukið ónæmi.

Breyting á framkvæmd næmisprófa á árinu gera samanburð á milli ára ómarktækan.

19% stofnanna mynduðu beta-laktamasa og eru því ónæmir fyrir penicillin og amoxicillin. Amoxicillin/clavulanic sýra virkar í flestum tilvikum á beta-laktamasamyndandi stofna.

Neisseria meningitidis

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Penicillin G	50%	0%	50%	0%	100%	0%	50%	-100%	50%	2	3
Ceftriaxone	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	2	3
Sulfonamides	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1	1
Rifampin	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	1	2

Salmonella

Allir stofnar	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	14%	0%	86%	15%	0%	85%	-1%	0%	1%	49	41
Ceftriaxone	0%	0%	100%	5%	0%	95%	-5%	0%	5%	49	41
Chloramphenicol	2%	0%	98%	7%	0%	93%	-5%	0%	5%	49	41
Trimethoprim/sulfamethoxazole	8%	0%	92%	5%	0%	95%	3%	0%	-3%	49	41
Nalidixic sýra	*	*	*	0%	0%	100%	*	*	*	*	4
Ciprofloxacin	4%	0%	96%	0%	0%	100%	4%	0%	-4%	49	41

*Ekki gert

Innlent smit	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	8%	0%	92%	6%	0%	94%	2%	0%	-2%	13	17
Ceftriaxone	0%	0%	100%	6%	0%	94%	-6%	0%	6%	13	17
Chloramphenicol	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	13	17
Trimethoprim/sulfamethoxazole	8%	0%	92%	6%	0%	94%	2%	0%	-2%	13	17
Nalidixic sýra	*	*	*	0%	0%	100%	*	*	*	*	2
Ciprofloxacin	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	13	17

*Ekki gert

Erlent smit	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Ampicillin	16%	0%	84%	19%	0%	81%	-3%	0%	3%	32	16
Ceftriaxone	0%	0%	100%	6%	0%	94%	-6%	0%	6%	32	16
Chloramphenicol	3%	0%	97%	12%	0%	88%	-9%	0%	9%	32	16
Trimethoprim/sulfamethoxazole	9%	0%	91%	6%	0%	94%	3%	0%	-3%	32	16
Nalidixic sýra	*	*	*	0%	0%	100%	*	*	*	*	1
Ciprofloxacin	6%	0%	94%	0%	0%	100%	6%	0%	-6%	32	16

*Ekki gert

Campylobacter

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Allir stofnar											
Erythromycin	1%	1%	98%	4%	0%	96%	-3%	1%	2%	100	75
Ciprofloxacin	44%	0%	56%	55%	0%	45%	-11%	0%	11%	100	75

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	R	I	S	R	I	S		
Innleint smit											
Erythromycin	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	50	24
Ciprofloxacin	6%	0%	94%	29%	0%	71%	-23%	0%	23%	50	24

	2013			2012			Munur milli ára			Fjöldi 2013	Fjöldi 2012
	R	I	S	3	I	S	R	I	S		
Erlent smit											
Erythromycin	0%	2%	98%	3%	0%	97%	-3%	2%	1%	41	33
Ciprofloxacin	88%	0%	12%	76%	0%	24%	12%	0%	-12%	41	33

Hlutfall ónæmra stofna (I og R) Campylobacter

